

Proceduren for gæster i bigården

Til gæster i Flakkebjergs bigårde, har vi indført følgende procedure, der skal sikre vores bier mod smitte, jævnfør EUs forordning om dyresundhed (2016/429)*

Du er velkommen i vores bigård!

For at undgå smitte af vores bier, skal du medbringe en rengjort bidragt og eventuelt handsker. Bruger man handsker, skal disse være nye og rene. Engangshandsker foretrækkes. Brugte læderhandsker må ikke anvendes. Stajejern, bibørste og tandstikker stilles til rådighed af bigårdens ejer. Røgpuster antændes kun ved behov. Dine kontaktoplysninger noteres, så vi kan kontakte dig, hvis der findes sygdom i bigården de næste uger.

Proceduren ved syn af bifamilier

- Åbn stadet forsigtigt, check låget for, om der er stadebiller.
- Læg låget omvendt på jorden, så eventuelle magasiner kan stables derpå.
- Vi starter synet i nederste magasin
- Når stadet er åbnet, skal alle rammer kontrolleres.
- Det vil sige både honning, fodertavler og yngellejets tavler, eventuelt vildbyg.
- Husk, at yngelceller i honningtavler, som ikke er klækkede, altid er mistænkelige! Du skal undersøge, hvorfor de ikke er klækkede?
- Ondartet bipest og europæisk bipest angriber ynglen, og man kan se et hullet uregelmæssigt yngelleje.
- Er der tegn på dette, eller ser yngellejet fint og kompakt ud?
- Stenyngel kan ses som mumier i biernes celler.
Hvordan adskiller man dem fra kalkyngel?
- Varroamider og tropilaelapsmider, hvordan finder man dem?
Er der droneyngel, kan man se efter dér, men hvad er de andre tegn?
- Rammer skal altid hænges retur på deres oprindelige plads og i samme retning, som da stadet blev åbnet.
- Undgå at klemme bier når stadet samles, ved at børste bier væk fra kasserne og ind på rammerne.

Finder man symptomer, udtages en prøve enten af bier, yngel eller skadegørere. Andre symptomer der er observeret noteres.

Er du sikker på, at de meldepligtige sygdomme ikke findes, melder du dette til instruktøren med samme klarhed, som du vil meddele det til en biavler, der har bestilt et syn. Husk, at I ikke må viderebringe smitte. Vask alt, der har været i kontakt med bierne, inden du syner næste bigård.

Trakémider og varroamider lever ret skjult, men hvad er de typiske tegn? Skal de to sygdomme meldes? Hvis 'ja', under hvilke betingelser?

Hvis I ikke har set klare symptomer på de syv meldepligtige skadegørere, men bierne ikke virker sunde, yngellejet er hullet, eller bifamilier er svækkede i forhold til årstiden,



de lugter ubehageligt, eller hvis bierne har skidt i stedet, så er I velkomne til at indsende en prøve fremfor at lave en sundhedsattest.

Vælger I at udtage en prøve, bedes du beskrive kort og præcist, hvad I har mistanke om på baggrund af de observationer, du har gjort. Det er let med ondartet bipest, "har set celler, der trækker tråd, og der lugter af surdej". Men for flere af de andre sygdomme er det mindre klart, og du hjælper os ved kort at beskrive din mistanke.

Har du mistanke om fund af lille stadebille eller Tropilaelapsmider, bedes du straks kontakte Flakkebjerg og gemme prøven i fryseren 24 timer, før du indsender den. Vi skal forhindre, at levende skadegørere spredes i forbindelse med transport.

Særlige regler i Flakkebjerg

For at undgå at bringe smitte fra laboratoriet, hvor vi blandt andet arbejder med diagnose af ondartet bipest, åbner vi altid vores egne bifamilier før vi starter arbejdet i laboratoriet og aldrig modsat.

* EU 2016/429 artikel 10 Operatørens (biavlerens) ansvar, stk 4 Biosikringsforanstaltninger, afsnit b) håndteringsforanstaltninger, der kan omfatte:

- i) procedurer for, hvordan dyr, produkter, køretøjer og personer kommer ind på og ud af virksomheden
- ii) procedurer for anvendelse af udstyr